

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP -2-3-67 618857

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION de la STATION de BORDEAUX (Tél. 92.06.25 et 92.26.94)

ABONNEMENT ANNUEL

(GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE, LANDES,  
BASSES-PYRÉNÉES, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Chemin d'Artigues, CENON (Gironde)  
C. C. P. : BORDEAUX 6707-65

25 F.

Supplément N° 1 au Bulletin Technique N° 77 de Février 1967

1967-3

## AVERTISSEMENTS

### ARBRES FRUITIERS

Tavelure des Poiriers - Le temps doux de la deuxième quinzaine de février a favorisé le départ de la végétation des Poiriers. Pour de nombreuses variétés, le débourrement est en cours.

En outre les Périthèces ont évolué rapidement et une faible proportion a atteint la maturité.

Des contaminations peuvent donc se produire prochainement par les conidies des chancres des rameaux, mais aussi par les Périthèces les plus avancés.

On doit donc prévoir dès à présent un premier traitement de préférence avec une Bouillie bordelaise à 1% ou une spécialité cuprique sur les variétés dont le débourrement est en cours ( stade C3).

Nous rappelons que dans les vergers très atteints par la Tavelure en 1966, on pourra réduire les risques de contaminations par l'épandage d'une solution de colorants nitrés à 1% sur les feuilles mortes restées sur le sol.

## INFORMATIONS

Cloque du Pêcher - Si malgré le beau temps de ces derniers jours le traitement contre la Cloque n'a pas été effectué, on peut encore intervenir avec une spécialité organique de synthèse.

Cloque du Prunier - (Maladie des Pochettes) Pour éviter la déformation des fruits on peut faire un traitement entre le débourrement et le stade du bouton blanc avec une spécialité organo-cuprique ou organique.

### COLZA

Charançons des tiges - Nous avons noté la sortie des premiers insectes.

Dans les champs où le Colza a atteint le début du développement des tiges et où les insectes ont été observés un traitement insecticide devrait être envisagé dès à présent.

### VIGNE

Excoriose - La période actuelle est encore favorable au traitement indiqué dans la note sur les traitements d'hiver. Il doit être appliqué par beau temps au moins 10 jours après la taille mais avant le débournement.

Bordeaux, le 28 février 1967

Le Contrôleur  
chargé des Avertissements  
C. ROUSSEL

Inprimerie de la Station de Bordeaux  
Directeur-Gérant: L. BOUYX

L'Inspecteur  
de la Protection des Végétaux  
J. BRUNETEAU

P 225